

nero-violacei inferiormente, estendendosi un po' questo colore anche sui margini inferiori laterali. Le anche sono inferiormente e lateralmente in parte brune o nerastre. Il mesosterno ed il metasterno sono ancor essi in parte bruno-nerastri; sono scavati al mezzo e leggermente bilobi. I femori posteriori hanno 9—10 spine nere su ciascun margine. L'armatura e le spine delle fibie posteriori sono come nella subsp. *capucina*. I tarsi sono grandi.

L'addome è un po' bruniccio. L'ovopositore, quasi dritto, abbastanza rigido ma non troppo, è di una gracilità che contrasta colla mole dell'insetto; ha circa la larghezza di 1 mm, è castagno, liscio, attenuato ma non proprio acuminato all'apice. La lamina sottogenitale è ampia, largamente rotondata all'apice, a lati esterni lievissimamente concavi. L'ultimo segmento addominale ventrale è posteriormente un po' prominente, ingrossato in senso trasversale, e sotto questa prominenza nasconde due piccoli lobuli laterali curvi, volti in dentro.

***Coluocera punctata* Märk. subsp. *sardoa* nov.**

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Die sardinische *Col. punctata* weicht recht sehr von den Stücken aus Sizilien ab und gehört vielleicht einer besonderen Art an.

Sie ist ähnlich gebaut, aber länglicher, ein wenig größer, die Punktur noch etwas deutlicher, auch auf dem Halsschild, der letztere ist weniger quer, kaum doppelt so lang als über den Vorderwinkeln lang, der eingestochene Punkt jederseits an der Basis fehlt und ist bloß durch einen dunklen Schatten markiert, die Flügeldecken länglicher eiförmig, stärker und dichter punktiert.

Sie wurde namentlich von Dr. Krausse bei Assuni gesammelt.